


Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 3 posti di Farmacista Dirigente, Area Farmacia, Disciplina Farmaceutica Ospedaliera presso il P.O.U. G.B. Grassi-C.P.O. dell'Azienda U.S.L. Roma 3, indetto con deliberazione n. 539 del 12.7.2019. Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 74 del 12.9.2019 – Parte Terza e sul sito istituzionale aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale n. 79 del 4/10/2019.

#### CRITERIO A

La Commissione definiti i "concetti chiave" che caratterizzano i 3 argomenti oggetto della prova scritta ed in relazione alla necessità di considerare diversamente gli ambiti specifici della terapia farmacologica oncologica ed antibiotica, rispetto alla trattazione più generale relativa alla gestione clinica della sideropenia nel paziente nefropatico, decide di applicare la griglia valutativa prova scritta in allegato.

#### CRITERIO B

Gli elaborati saranno valutati anche in relazione alla specifica competenza nell'esposizione tecnica farmaceutica e nella capacità di sintesi rispetto ad argomenti scientifici, con la possibilità di attribuire un massimo di 5 punti.

Handwritten signature or initials, possibly 'L', 'M', and 'Fe' stacked vertically.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 3 posti di Farmacista Dirigente, Area Farmacia, Disciplina Farmaceutica Ospedaliera presso il P.O.U. G.B. Grassi-C.P.O. dell'Azienda U.S.L. Roma 3, indetto con deliberazione n. 539 del 12.7.2019. Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 74 del 12.9.2019 – Parte Terza e sul sito istituzionale aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale n. 79 del 4/10/2019.

Argomento 1	Punti 0,75	Punti:0,75	Punti 0,75	Punti 0,75	Punti 0,75	Punti 0,75
Pembrolizumab: classe farmacoterapeutica e meccanismo d'azione	anticorpo Monoclonale umanizzato	legame PD1- effetto antagonista ligando PDL1 e PDL2	Svolge la sua attività a livello delle cellule e dell'ambiente tumorale	Immunomodulazione- potenza la risposta delle cellule T		
Indicazioni d'uso e	carcinoma polmonare non a piccole cellule	Carcinoma uroteliale	Linfoma di Hodgkin	melanoma		carcinoma a cellule renali
	Carcinoma a cellule squamose testa collo					
rimborsabilità	Farmaco innovativo Melanoma metastatico	Farmaco innovatività condizionata nel carcinoma uroteliale e Linfoma di Hodgkin	Farmaco innovativo polmonare non a piccole cellule 1 linea	Compilazione scheda AIFA appropriatezza Prescrittiva		Prescrizione oncologo Prescrizione ematologo
						Totale

Argomento 2	Punti 0,75	Punti 0,75	Punti 0,75	Punti 0,75	Punti 0,75	Punti 0,75
Ceftolozano/tazobactam: classe farmacoterapeutica e meccanismo d'azione	cefalosporina di nuova generazione	interazione con parete cellulare gram-	tazobactam inibitore beta lattamasi	battericida		
Indicazioni d'uso	Infezioni intraddominali complicate	pielonefrite acuta	infezioni complicate del tratto urinario	infezioni sostenute gram-		attivo Pseudomonas aeruginosa
e criteri di accesso alla terapia	trattamento di II linea	prescrivibile su presentazione dell'antibiogramma nelle condizioni pielonefrite e infezioni tratto urinario	Prescrizione infettivologo o specialista identificato dal CICA	compilazione scheda AIFA		Farmaco sottoposto monitoraggio Regione Lazio secondo il piano PAICA
	farmaco ad Uso Ospedaliero					Totale

Criterio A - Griglia di valutazione prova scritta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 3 posti di Farmacista Dirigente, Area Farmacia, Disciplina Farmaceutica Ospedaliera presso il P.O.U. G.B. Grassi-C.P.O. dell'Azienda U.S.L. Roma 3, indetto con deliberazione n. 539 del 12.7.2019. Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 74 del 12.9.2019 – Parte Terza e sul sito istituzionale aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale n. 79 del 4/10/2019.

Argomento 3	Punti 0,53	Punti 0,53	Punti 0,53	Punti 0,53	Punti 0,53	Punti 0,53
La sideremia nel paziente nefropatico: Inquadramento clinico	Deficit marziale condizione frequente nel quadro patologico	Perdite occulte di ferro a livello Gi	Stato infiammatorio cronico con minor assorbimento di FE	Terapia di prima linea: reintegro orale		
Analisi delle diverse possibilità di trattamento farmacologico	In II linea integrazione endovenosa con saccarato	In II linea integrazione endovenosa con gluconato	In II linea integrazione endovenosa con carbosimaltoso	Il ferro carbosimaltoso è più stabile degli altri 2 e rilascia meno Fe libero	Non sono presenti studi comparativi e di superiorità	
	Ferro saccarato in fascia C	utilizzo di forme a rilascio più costo è compatibile e con l'erogazione ambulatoriale	in regime di ricovero utilizzo del ferro gluconato è economico ed efficace	soggetto a raccomandazione nell'utilizzo da parte di AIFA ed EMA		
	farmaco ad uso ospedaliero	corretto carico marziale consente un ottimismo nell'utilizzo di ESA				Totale

Criterio A - Griglia di valutazione prova scritta.