


PROVA NON ESIRATA

C. P. M.



PROVA SCRITTA 2

1. L'ernia di spigelio si fa strada:
  - a. a livello del margine laterale del muscolo retto, all'altezza dell'angolo esterno dell'arcata di Douglas
  - b. in corrispondenza della linea alba
  - c. a livello del triangolo di Petit
  - d. a livello del canale inguinale
  
2. Quale di queste complicanze non è propria dell'ulcera duodenale:
  - a. Perforazione
  - b. cancerizzazione
  - c. stenosi
  - d. emorragia
  
3. Per quale delle seguenti malattie la chirurgia laparoscopica rappresenta il gold standard?
  - a. cancro del colon
  - b. occlusione intestinale
  - c. calcolosi della colecisti
  - d. Tutte le risposte sono corrette
  
4. La mastectomia radicale secondo Madden comporta l'asportazione di quali strutture?
  - a. mammella, linfonodi ascellari, grande e piccolo pettorale
  - b. mammella, linfonodi ascellari, grande pettorale
  - c. mammella, linfonodi ascellari, piccolo pettorale
  - d. mammella, linfonodi ascellari
  
5. La localizzazione più frequente dei gastrinomi è:
  - a. Antro gastrico
  - b. Duodeno
  - c. Pancreas
  - d. Milza
  
6. La presenza della triade clinica costituita da dolore addominale, diarrea (talora muco-sanguinolenta), fibrillazione atriale deve indurre il sospetto di:
  - a. infarto intestinale
  - b. colite ulcerosa
  - c. enterocolite necrotizzante
  - d. tifo

7. Per sfintere esofageo superiore si intende:
- Una zona ad alta pressione endoluminale disposta tra ipofaringe ed esofago lunga circa 3 cm
  - Una struttura anatomica costituita da fibre muscolari lisce situata tra esofago cervicale e toracico
  - Una struttura anatomica costituita da fibre muscolari striate situata tra esofago cervicale e toracico
  - Un ipertono della muscolatura liscia dell'esofago toracico
8. Per quanto riguarda l'ernia iatale da scivolamento una delle seguenti è la complicanza più frequente:
- esofagite peptica
  - perforazione esofagea
  - gastrite atrofica
  - volvolo gastrico
9. La MEN di tipo 2A è caratterizzata da tutte le seguenti patologie, eccetto:
- Iperplasia delle paratiroidi
  - Feocromocitoma
  - carcinoma midollare della tiroide
  - Tumore corticosurrenalico
10. La linea di Malgaigne:
- consente di distinguere le ernie inguinali da quelle crurali
  - congunge l'ombelico al tubercolo del pube
  - corrisponde alla linea bis-iliaca
  - corrisponde alla linea ombelicale traversa
11. La forma più frequente di tumori maligni cistici del pancreas:
- Sarcoma
  - Cistoadenoma sieroso
  - Cistoadenocarcinoma mucinoso
  - Papilloma intraduttale
12. L'ostruzione intestinale nei pazienti in età adulta è provocata più frequentemente da:

- a. tumori del digiuno
- b. invaginazione intestinale
- c. malattie infiammatorie
- d. aderenze

13. In che incidenza esiste negli affetti di carcinoma colo-rettale una predisposizione autosomica dominante alla malattia:

- a. 6%
- b. 30%
- c. 53%
- d. 60%

14. L'ernia di Littrè contiene

- a. Omento
- b. ovaio con salpinge
- c. Diverticolo di Meckel
- d. Testicolo

15. La pancreatite acuta si associa a litiasi biliare nel

- a. 1-5% dei casi
- b. 5-10% dei casi
- c. 20% dei casi
- d. 40-80% dei casi
- e. 100% dei casi

16. Riscontro di Tumore Neuroendocrino dopo appendicectomia: quale tra questi è un criterio fondamentale per eseguire un'emicolecomia destra oncologica?

- a. Dimensioni del tumore tra 1 e 2 cm
- b. Invasione del meso-appendice tra 2 e 3 mm
- c. Ki67  $\geq$  3
- d. Giovane età

17. Tumore T2a della colecisti

- a. Tumore che infiltra il connettivo pericolecistico senza invasione della seriosa o del fegato (versante epatico)
- b. Tumore che infiltra il connettivo pericolecistico senza invasione della seriosa o del fegato (versante peritoneale)
- c. Tumore che infiltra lo strato muscolare della colecisti
- d. Tumore che infiltra la lamina propria

18. Secondo la classificazione di Strasberg in corso di colecistectomia lo stadio E1 rappresenta
- Una lesione del dotto cistico
  - Una lesione dell'epatico di dx
  - Una lesione circonferenziale della VBP a più di 2 cm dalla convergenza
  - Una lesione circonferenziale della VBP a meno di 2 cm dalla convergenza
19. Il tumore pancreatico può essere correlato a sindromi familiari, quale tra queste ne incrementa di più il rischio
- Sindrome di Lynch
  - Sindrome di Peutz-Jegers
  - Sindrome di Noonan
  - Pancreatite ereditaria
20. In quali di questi casi è indicata la linfadenectomia del comparto centrale nel Tumore Papillifero della Tiroide?
- Tir 4 superiore a 4 cm
  - In tutti i Tir 4
  - a+d
  - Tir 5
21. Stadiazione del carcinoma della tiroide ajcc 8 ed.
- Il cut off per età è invariato, la estensione microscopica extra-capsulare modifica prognosi
  - Il cut off per età è 55 aa, l'estensione microscopica extra-capsulare non modifica prognosi
  - Il cut off per età è 45 aa, l'estensione microscopica extra-capsulare non modifica prognosi
  - Il cut off per età è 65 aa, l'estensione microscopica extra-capsulare modifica prognosi
22. Nel trauma pelvico di grado moderato (WSES II) emodinamicamente stabile e con meccanica instabile qual è il trattamento di prima linea?
- Pelvic binder immediato + Tc addome e se presente blush eseguire angioembolizzazione poi fissatore esterno C-clamp
  - Fissatore esterno + Tc addome e se presente blush eseguire angioembolizzazione
  - Pelvic binder immediato + Tc addome e se presente blush eseguire packing pelvico,

- poi fissatore esterno C-clamp
- d. Nessuna risposta è corretta

23. Come si caratterizza la diverticolite acuta di grado 1b secondo la classificazione WSES 2016:

- a. Ascesso di dimensioni superiori a 4 cm
- b. Ascesso di dimensioni uguali o inferiore a 4 cm
- c. Bolle d'aria pericoliche o modico versamento pericolico in assenza di ascesso
- d. Ascesso di dimensioni inferiori a 2 cm

24. Regime di trattamento ernia inguinale in elezione

- a. Ricovero ordinario
- b. Ricovero One-Day Surgery
- c. Ricovero in Day Surgery
- d. Ricovero in APA

25. Quanti linfonodi deve contenere un pezzo operatorio dopo TME nel carcinoma del retto non neoadiuvato:

- a. Almeno 10
- b. Almeno 12
- c. Almeno 15
- d. Almeno 20

26. Che cos'è la Sindrome di Dunbar?

- a. È la sindrome da compressione intermittente del tripode celiaco
- b. È una sindrome paraneoplastica da tumore neuroendocrino del pancreas
- c. È la sindrome da furto della succlavia
- d. È il falso addome acuto da porfiria acuta intermittente

27. Quando è indicato un intervento di chirurgia bariatrica:

- a. BMI > 40 in assenza di ogni altra comorbidità
- b. BMI tra 35 e 40 in presenza di comorbidità associate all'obesità
- c. BMI tra 30 e 35 in presenza di comorbidità associate all'obesità
- d. Tutte le risposte sono corrette

28. Nella stadiazione del carcinoma del rene AJCC 8 ed.

- a. Lo stadio III è determinato da parametro T4, o parametro M1
- b. Lo stadio III è determinato da parametro T2, o parametro M1

- c. Lo stadio III è determinato da parametro T3, o parametro N1
- d. Lo stadio III è determinato solo da parametro T4

29. La biopsia del linfonodo sentinella per tumore della mammella è indicata in quale di queste situazioni:

- a. Stadio clinico I-II con linfonodi clinicamente sospetti con agoaspirato negativo
- b. Sempre in caso di carcinoma duttale in situ e carcinoma duttale infiltrante stadio clinico I-II con linfonodi clinicamente negative
- c. Solo nello stadio II con linfonodi clinicamente negativi
- d. a+b

30. Come si definisce un trauma splenico di grado II secondo la classificazione AAST:

- a. Ematoma sottocapsulare tra 10–50% della superficie o intraparenchimale < 5 cm di diametro oppure lacerazione tra 1 e 3 cm di profondità senza coinvolgere vasi parenchimali
- b. Ematoma sottocapsulare > 50% della superficie o intraparenchimale < 5 cm di diametro oppure lacerazione tra 1 e 3 cm di profondità senza coinvolgere vasi parenchimali
- c. Ematoma sottocapsulare > 50% della superficie o intraparenchimale < 5 cm di diametro oppure lacerazione tra 1 e 3 cm di profondità con coinvolgimento dei vasi parenchimali
- d. Ematoma sottocapsulare tra 10–50% della superficie o intraparenchimale < 5 cm di diametro oppure lacerazione tra 1 e 3 cm di profondità con coinvolgimento dei vasi parenchimali