

PROVA SCRITTA

- 1) I centri di terapia intensiva degli ospedali comprendono:
 - a) I centri di emodialisi;
 - b) I laboratori di analisi;
 - c) Gli ambulatori;
 - d) Nessuna delle precedenti risposte;
- 2) Per quali delle seguenti malattie è prevista in Italia la vaccinazione obbligatoria per tutti i nuovi nati:
 - a) morbillo;
 - b) tetano;
 - c) tubercolosi;
 - d) influenza;
- 3) Il Day – Surgery:
 - a) prevede trattamenti chirurgici in regime di ricovero diurno;
 - b) riduce la lunghezza della degenza media in Italia;
 - c) è una modalità di ricovero ospedaliero in espansione in Italia;
 - d) tutte le risposte precedenti;
- 4) tra i fattori di rischio oncogeno occupazionale qual è responsabile del mesotelioma della pleura:
 - a) amine aromatiche;
 - b) cloruro di vinile;
 - c) asbesto;
 - d) nichel;
- 5) le sale operatorie devono:
 - a) essere illuminate naturalmente;
 - b) avere un sistema di controllo artificiale del microclima interno;
 - c) avere una superficie di almeno 45 mq;
 - d) nessuna delle precedenti risposte;
- 6) le infezioni ospedaliere possono essere causate da:
 - a) virus;
 - b) batteri;
 - c) miceti;
 - d) tutte le risposte precedenti;
- 7) oltre i locali adibiti al lavoro, nei luoghi di lavoro con più di 50 dipendenti sono da predisporre strutture quali:
 - a) spogliatoi;
 - b) dormitori;
 - c) locali di insegnamento;
 - d) nessuna delle precedenti risposte;
- 8) quali sono le caratteristiche dei lavori d'ufficio:
 - a) esalazioni nocive;
 - b) impiego sempre più generalizzato di videoterminali;
 - c) alta rumorosità;
 - d) nessuna delle precedenti risposte;

- 9) una prevenzione razionale delle infezioni ospedaliere si può attuare mediante:
- copertura antibiotica durante tutta la durata della degenza;
 - controllo dei sistemi di sterilizzazione;
 - chemiopprofilassi perioperatoria per qualunque tipo di intervento chirurgico;
 - nessuna delle precedenti risposte;
- 10) la prevenzione delle infezioni ospedaliere si basa su:
- educazione sanitaria;
 - organizzazione sanitaria dei servizi ospedalieri;
 - pratiche di immunoprofilassi;
 - tutte le risposte precedenti;
- 11) una conferenza sulla prevenzione delle cardiopatie ischemiche svolta in una scuola può essere classificato come intervento di:
- prevenzione primaria;
 - prevenzione secondaria;
 - prevenzione terziaria;
 - nessuna delle precedenti risposte;
- 12) nell'ambito delle cause di morte, nell'ultimo trentennio, in Italia, si è assistito a:
- diminuzione delle malattie cardiovascolari;
 - lieve aumento delle malattie infettive;
 - diminuzione delle malattie dell'apparato respiratorio;
 - Nessuna delle precedenti risposte;
- 13) Lo stato di salute ideale viene definito dall'OMS come:
- Completo benessere fisico;
 - Completo benessere fisico e mentale;
 - Completo benessere fisico, mentale e sociale;
 - Nessuna delle precedenti risposte;
- 14) Nelle patologie cronico – degenerative i fattori di rischio possono essere:
- Sufficienti;
 - Necessari;
 - Multipli;
 - Nessuna delle precedenti risposte;
- 15) Quali, tra i seguenti possono essere considerati fattori di rischio individuali?
- Familiarità per una determinata patologia cronica;
 - Inquinamento atmosferico;
 - Dieta ricca di sostanze grasse;
 - Nessuna delle precedenti risposte;
- 16) Nell'ambito di campagne di educazione sanitaria, i processi formativi:
- Forniscono generalmente risultati scarsi;
 - Sono meno efficaci di quelli informativi;
 - Consistono nell'invio di messaggi unidirezionali ai destinatari;
 - Nessuna delle precedenti risposte;
- 17) Qual è la più adeguata popolazione bersaglio per campagne di educazione sanitaria contro il fumo di sigaretta:
- Lavoro;
 - Scuola media;
 - Università;
 - Nessuna delle precedenti risposte;

- 18) Qual è la più adeguata popolazione bersaglio per campagne di educazione sanitaria contro le malattie croniche:
- Scuola elementare;
 - Scuola media;
 - Università;
 - Nessuna delle precedenti risposte;
- 19) La fase subclinica di una malattia cronica:
- Può durare anche diversi anni;
 - È il momento in cui si possono effettuare interventi di prevenzione secondaria;
 - È il momento in cui si possono effettuare interventi utilizzando i test di screening;
 - Tutte le risposte precedenti;
- 20) Quali, tra i seguenti fattori, devono essere considerati prima di intraprendere una campagna di screening:
- Specificità del test;
 - Valore predittivo del test;
 - Costo del test;
 - Tutte le risposte precedenti;
- 21) La più adatta misura epidemiologica per valutare l'utilizzo delle misure sanitarie diagnostiche – curative è:
- Tasso di incidenza;
 - Tasso di ospedalizzazione;
 - Morbilità;
 - Nessuna delle precedenti risposte;
- 22) L'impiego della insulina nella terapia del diabete mellito ha portato a:
- Drastica diminuzione dell'incidenza del diabete;
 - aumento della incidenza del diabete;
 - diminuzione della prevalenza del diabete;;
 - nessuna delle risposte precedenti;
- 23) quando è provato che un nuovo trattamento antibiotico evita la morte senza portare a guarigione completa può accadere che:
- la prevalenza della malattia diminuisca;
 - la prevalenza della malattia aumenti;
 - l'incidenza della malattia aumenti;
 - nessuna delle precedenti risposte;
- 24) quale tra le seguenti fonti è la più appropriata per stimare la quantità di posti letto necessari:
- notificazione di malattie infettive;
 - schede di morte;
 - schede di dimissione ospedaliere;
 - nessuna delle precedenti risposte;
- 25) quali tra le seguenti fonti possono essere utilizzate per valutare gli effetti dell'alcol a livello epatico:
- schede di morte;
 - schede di dimissioni ospedaliere;
 - registri tumori;
 - nessuna delle precedenti risposte;
- 26) quali tra i seguenti fattori di rischio può essere valutato con maggiore correttezza negli studi di prevalenza e caso – controllo:
- ipercolesterolemia;
 - dieta ipercalorica;
 - gruppo sanguigno A;
 - nessuna delle precedenti risposte;

- 27) lo studio longitudinale di Framingham è stato impostato per studiare:
- a) infarto del miocardio;
 - b) ictus cerebrale;
 - c) angina;
 - d) tutte le risposte precedenti;
- 28) lo studio longitudinale di Doll e Peto è stato impostato per studiare:
- a) tumore del polmone,
 - b) tumore del pancreas;
 - c) ictus celebrale;
 - d) tutte le risposte precedenti;
- 29) in uno studio longitudinale che intende valutare l'effetto di asbesto e anilina in un gruppo di lavoratori esposti a questi due contaminanti, il gruppo di controllo:
- a) può essere esposto o all'asbesto o all'anilina ma non ad entrambi simultaneamente;;
 - b) non deve essere costituito da lavoratori;
 - c) non può eseguire nessun controllo;;
 - d) nessuna delle risposte precedenti;
- 30) nella fase II della sperimentazione clinica di un farmaco:
- a) si valuta soprattutto l'effetto clinico della sostanza;
 - b) si paragona il farmaco con trattamenti già in uso;
 - c) si effettua la sorveglianza post – registrazione;
 - d) nessuna delle precedenti risposte;