

PROVA NON ESTRATTA

Luca

Vincenzo Leo

concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2 posti di Farmacista Dirigente
- Disciplina Farmaceutica Territoriale presso l'Azienda USL Roma 3, indetto con deliberazione n. 539 del
12.07.2019
Traccia 3

1.	il Pavilizumab è:	<p>a. un anticorpo monoclonale per il trattamento della infezione da virus respiratorio sinciziale neonatale</p> <p>b. un anticorpo monoclonale per la prevenzione della infezione da virus respiratorio sinciziale in neonati pre-termine</p> <p>c. un anticorpo monoclonale per il trattamento sintomatico della sindrome da virus respiratorio sinciziale in neonati pretermine</p> <p>d. un anticorpo monoclonale per il trattamento della infezione da virus respiratorio sinciziale neonatale</p>
2.	Ivacaftor e Lumafactor indicazione:	<p>a. Trattamento della FC in pazienti di età pari o superiore a 12 anni omozigoti per la mutazione F508 del gene CFTR</p> <p>b. Trattamento della fibrosi cistica in pazienti di età superiore ai 6 anni di peso pari o superiore a 25 kg che hanno una delle seguenti mutazioni del gating (di classe III) del gene CFTR: G551D,G1244E,G1349D,G178R,G551S,S1251N,S125P,S549N,S549R. Inoltre è indicato per pazienti con FC di età superiore pari o superiore a 18 anni che hanno mutazione R117H.</p> <p>c. Trattamento della fibrosi cistica in pazienti di età superiore ai 6 anni di peso pari o superiore a 25 kg che hanno una delle seguenti mutazioni del gating (di classe III) del gene CFTR: G551D,G1244E,G1349D,G178R,G551S,S1251N,S125P,S549N,S549R.</p> <p>d. Tutte e due le indicazioni sopraindicate</p>
3.	Nel dolore viscerale (dolore relativo a organi e masse neoplastiche) i farmaci di prima, seconda e terza scelta sono rispettivamente:	<p>a. oppiacei, antispastici, anestetici locali</p> <p>b. paracetamolo e fans, anestetici locali, oppiacei</p> <p>c. paracetamolo e fans, oppiacei, anestetici locali,</p> <p>d. anestetici locali, paracetamolo e fans, oppiacei</p>
4.	Nel dolore neuropatico puro i farmaci di i farmaci di prima, seconda e terza scelta sono rispettivamente:	<p>a. anestetici locali, antidepressivi/anticonvulsivanti, oppiacei</p> <p>b. antidepressivi/anticonvulsivanti, anestetici locali, oppiacei</p> <p>c. anestetici locali, antidepressivi/anticonvulsivanti, oppiacei</p> <p>d. oppiacei, antidepressivi/anticonvulsivanti, anestetici locali</p>
5.	Il meccanismo d'azione degli anticorpi monoclonali inibitori di PCSK9 (proteina convertasi subtilisina/kexina di tipo 9) è il seguente:	<p>a. Inibendo l'attività di PCSK9, questi farmaci permettono di esporre un maggior numero di recettori sugli epatociti, con conseguente maggiore captazione epatica di LDL-C e riduzione dei livelli circolanti di LDL-C</p> <p>b. Inibendone l'attività di PCSK9, questi farmaci permettono di ridurre il numero di recettori sugli epatociti, con conseguente maggiore captazione epatica di LDL-C e riduzione dei livelli circolanti di LDL-C</p> <p>c. Inibendone l'attività di PCSK9, questi farmaci permettono di aumentare il numero di recettori sugli epatociti, con conseguente riduzione captazione epatica di LDL-C e aumento dei livelli circolanti di LDL-C</p> <p>d. Inibendone l'attività di PCSK9, questi farmaci permettono di aumentare il numero di recettori sugli epatociti, con conseguente</p>

h

M AT DO

concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2 posti di Farmacista Dirigente
 - Disciplina Farmaceutica Territoriale presso l'Azienda USL Roma 3, indetto con deliberazione n. 539 del
 12.07.2019
 Traccia 3

		riduzione della captazione epatica di LDL-C e riduzione dei livelli circolanti di LDL-C
6.	Cosa si intende per compliance?	<ul style="list-style-type: none"> a. l'assunzione di una medicina in maniera non corretta b. il grado di condiscendenza del paziente nei confronti della terapia prescrittagli c. l'interruzione anticipata della terapia da parte del paziente d. il mancato rispetto dei tempi e della sequenza di somministrazione di un farmaco
7.	Quale dei seguenti FANS svolge anche attività antiaggregante piastrinica:	<ul style="list-style-type: none"> a. ibuprofene b. nimesulide c. aspirina d. paracetamolo
8.	Nella terapia del dolore cronico non oncologico quale delle seguenti affermazioni è corretta:	<ul style="list-style-type: none"> a. Gli oppiacei sono farmaci sempre sconsigliati nel dolore non oncologico b. Gli analgesici oppiacei sono farmaci di prima scelta nel dolore neuropatico puro c. Gli analgesici oppiacei sono la prima scelta nel dolore viscerale d. Gli oppiacei sono i farmaci di 1° scelta solo nel dolore viscerale
9.	Nusinersen indicazioni d'uso:	<ul style="list-style-type: none"> a. sclerosi multipla recidivante remittente; b. atrofia muscolare spinale SMA 5 s c. atrofia muscolare spinale SMA 5q d. sclerosi Laterale amiotrofica
10.	Quale fra le seguenti affermazioni circa l'idursulfasi, non è corretta:	<ul style="list-style-type: none"> a. è una copia dell'enzima umano iduronato-2-solfatasi. b. È prodotto con un metodo DNA ricombinante c. L'idursulfasi sostituisce l'enzima mancante o insufficiente nei pazienti con sindrome di Hunter. Fornendo l'enzima si riesce a migliorare o a controllare i sintomi della malattia è una copia d. È prodotto in cellula murina e successivamente umanizzato;
11.	Indicare quale di questi meccanismi d'azione NON appartiene alla classe degli antidepressivi	<ul style="list-style-type: none"> a. Inibitori delle MAO (MAOI) b. Agonisti dei recettori 5-HT c. Inibitori non selettivi della ricaptazione di NA e 5-HT (TCA e SNRI) d. Inibitori selettivi della ricaptazione della 5-HT (SSRI) –
12.	Quali fra le seguenti terapie per la SM non è di seconda linea:	<ul style="list-style-type: none"> a. Natalizumab b. Dimetilfumarato c. Alemtuzumab d. Nessuna delle precedenti
13.	l'emicizumab è un anticorpo monoclonale utilizzato:	<ul style="list-style-type: none"> a. Nel trattamento dell'emofilia a. Nel trattamento dell'emigrania b. Nel trattamento dell'ipercolesterolemia c. Nessuna delle precedenti

dw

M. G. J.

concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2 posti di Farmacista Dirigente
 - Disciplina Farmaceutica Territoriale presso l'Azienda USL Roma 3, indetto con deliberazione n. 539 del
 12.07.2019
 Traccia 3

14.	L'erenumab è indicato :	<ul style="list-style-type: none"> a. per la profilassi dell'emicrania in adulti che hanno almeno 4 giorni di emicrania al mese. b. per la profilassi di routine degli episodi emorragici in pazienti affetti da emofilia A con inibitori del fattore VIII c. per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti precedentemente trattati con bifosfonati e che abbiano riportato una frattura vertebrale in corso di trattamento d. nessuna delle precedenti
15.	Il propofol è:	<ul style="list-style-type: none"> a. un farmaco inotropo positivo b. un anestetico locale c. un lassativo d. un anestetico generale
16.	La biotrasformazione di un farmaco produce solitamente un composto:	<ul style="list-style-type: none"> a. più liposolubile del farmaco di partenza b. meno liposolubile di un farmaco di partenza c. che penetra con più facilità all'interno della cellula d. più facilmente riassorbito dai tubuli renali
17.	Quali tra questi farmaci è usato come immunosoppressore:	<ul style="list-style-type: none"> a. tacrolimus b. cimetidina c. rosigitazone d. cromoglicato di sodio
18.	Gli antagonisti dei recettori 5-HT ₃ possono essere impiegati in terapia come:	<ul style="list-style-type: none"> a. Antiemetici b. Antidepressivi c. Anoressizzanti d. Sedativi
19.	Indicare quale delle caratteristiche sotto-indicate è valida per un antagonista competitivo:	<ul style="list-style-type: none"> a. è dotato sia di attività intrinseca che di affinità specifica per il suo recettore b. è dotato solo di affinità specifica per il suo recettore c. è dotato solo di attività intrinseca per il suo recettore d. non è dotato ne' di attività intrinseca ne' di affinità specifica per il suo recettore e.
20.	Quale dei seguenti farmaci attiva direttamente i recettori D ₂ dopaminergici:	<ul style="list-style-type: none"> a. Baclofene b. Bromocriptina c. Selegilina d. L-DOPA
21.	Le infezioni da <i>Pseudomonas</i> sono sensibili:	<ul style="list-style-type: none"> a. Alla Doxorubicina b. All' Amfotericina B c. Al Ceftazidime d. Al Clotrimazolo
22.	Quale è il recettore per la azione dei farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)?	<ul style="list-style-type: none"> a. 5-lipoossigenasi b. fosfolipasi A2 c. cicloossigenasi d. citocromo P450 reduttasi

ff

M G A

concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2 posti di Farmacista Dirigente
- Disciplina Farmaceutica Territoriale presso l'Azienda USL Roma 3, indetto con deliberazione n. 539 del
12.07.2019
Traccia 3

23.	Quali dei seguenti corticosteroidi sono generalmente usati nell'asma allergico per via inalatoria?	a. idrocortisone b. metilprednisolone c. desametasone d. fluticasone propionato
24.	Quale farmaco è utile somministrare nelle intossicazioni acute da benzodiazepine?	a. penicillina b. naloxone c. atropina d. flumazenil
25.	L'eparina:	a. agisce legandosi all'antitrombina III b. possiede attività trombolitica c. possiede attività più prolungata dopo somministrazione orale d. agisce bloccando la rigenerazione epatica di vitamina K
26.	Tra le seguenti statine, la più potente è:	a. simvastatina b. atorvastatina c. pravastatina d. fluvastatina
27.	Lo studio dei fattori che determinano le variazioni della concentrazione plasmatica di un farmaco nel tempo è definito:	a. farmacodinamica b. farmacovigilanza c. farmacocinetica d. farmacogenetica
28.	Quale DOAC presenta un antidoto:	a. Apixaban b. Edoxaban c. Rivaroxaban d. Dabigatran
29.	La presenza di cibo non influisce nell'assorbimento di:	a. Dabigatran b. Rivaroxaban c. Rivaroxaban e dabigatran d. Apixaban ed Edoxaban
30.	I recettori per gli oppioidi sono:	a. accoppiati ad attività tirosin-chinasi b. accoppiati all'adenilciclastasi tramite proteina Gs c. accoppiati all'adenilciclastasi tramite proteina Gi d. recettori citoplasmatici

PROVA NON ESTRATTA



A.O.U Sant'Andrea
U.O Ematologia
Dott.a Rossi Roberta

Si prescrive per la Sig.a De Rossi Raffaella, nata a Roma il 12 Settembre 1962, affetta da Mieloma Multiplo a Rischio elevato:

Seleparina 0,4 1 fl/die per 12 settimane

Data 24/07/2020

A.O.U. SANTI'ANDREA
Dott.ssa Rossi Roberta
U.O. Ematologia
Cod.9194208191802336

